



CRP (snabbsänka)

RoACTEMRA® är ett läkemedel som dämpar CRP-stegring. Vid misstanke på bakteriell infektion kan ett normalt CRP inte utesluta infektion, däremot stiger *vanligen* kroppstemperaturen och/eller antalet vita blodkroppar vid infektion.

Infektioner

RoACTEMRA ökar risken att få infektioner, som kan bli allvarliga om de inte behandlas. Dessutom kan vissa tidigare infektioner återkomma.

- Du ska inte behandlas med RoACTEMRA om du har en allvarlig infektion.
- Ditt barn ska inte behandlas med RoACTEMRA om han/hon har en infektion eller tecken på en infektion, såsom feber, hosta eller huvudvärk, eller inte känner sig bra.
- Du/ditt barn ska ha undersökts för tuberkulos innan du/ditt barn behandlas med RoACTEMRA.
- Tala med din läkare om vilka eventuella vaccinationer du/ditt barn kan behöva innan du/ditt barn påbörjar behandling med RoACTEMRA.
- Om du/ditt barn har någon slags infektion (även en förkylning) vid tidpunkten för din/ditt barns nästa behandling, ska infusionen efter samråd med din läkare, skjutas upp tills dess att du/ditt barn mår bättre.
- Yngre barn med sJIA kan ha svårare att kommunicera sina symtom och därför ska föräldrar/vårdnadshavare till patienter med sJIA kontakta sjukvårdspersonal omedelbart om barnet av okänd anledning inte mår bra.
- Sök omedelbart vård om du/ditt barn utvecklar symtom såsom feber, ihållande hosta, viktminskning, smärta eller ont i halsen, pipande andning, röda eller svullna blåsor på huden, rivmärken, sår, påtaglig svaghet eller trötthet.
- Tala om för din läkare om du/ditt barn har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du/ditt barn är bärare av hepatit B-virus.

Komplikationer av divertikulit (inflammerade fickbildningar på tarmen)

Patienter som använder RoACTEMRA kan utveckla komplikationer av divertikulit som kan bli allvarliga om de inte behandlas.

- Sök omedelbart vård om du/ditt barn utvecklar buksmärta, kolik eller upptäcker blod i avföringen.



RoACTEMRA®
tocilizumab

Ha med dig detta kort åtminstone 3 månader efter din eller ditt barns sista RoACTEMRA-dos eftersom biverkningar kan förekomma under en viss tid efter din eller ditt barns senaste dos av RoACTEMRA.

Läkarens telefonnummer:

Läkarens namn:

Förälderns/vårdnadshavarens namn:

Patientens namn:

Se till att du har en förteckning över alla dina/ditt barns läkemedel med dig vid varje läkarbesök.

Senaste behandling:

Start:

Datum för behandling med RoACTEMRA



RoACTEMRA är godkänt för behandling av reumatoid artrit hos vuxna (från 18 år) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos barn (från 2 år).

Patientkort för RoACTEMRA

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du som patient eller du som förälder/vårdnadshavare behöver känna till innan och under behandling med RoACTEMRA.

- Visa detta kort för varje läkare som är delaktig i din/ditt barns vård.
- Läs broschyren *Vad du bör veta om RoACTEMRA* och bipacksedeln för RoACTEMRA för ytterligare information.



REUMATOLOGI

Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm. Tel 08-726 12 00
www.roche.se